

TRIBOR

Gruppo 0



ADATTABILE E PRODUTTIVA

- **MEDIO-PRECOCE PER ADATTARSI A TUTTE LE CONDIZIONI**

Adattabile e produttiva in tutti gli ambienti

- **BUONA TENUTA ALL'ALLETAMENTO E RAMIFICAZIONE**

Elevata tolleranza anche a fine ciclo durante la maturazione

- **NON DEISCENTE**

Mantiene i baccelli ben chiusi anche a maturazione piena



Caratteristiche

Maturità **0.8**

Colore del fiore **Viola**

Colore ilo **Marrone**

Peso 1000 semi **Alta**

Tenore proteico **38 - 40 %**

Contenuto in olio **Media**

Taglia di pianta **Medio - Bassa**

Inserzione primo palco **Media**

Sviluppo **Mezzo indeterminato**

Caratteri agronomici

Copertura del suolo

9

Capacità di ramificazione

8

Vigore germinativo

6

Tenuta all'allettamento

9

Tolleranza allo stress idrico

7

1-3 sensibile - scarso | 4-6 medio - buono | 7-9 tollerante - eccellente

Adattamento del periodo di semina

| | Precoce | Ottimale | Tardivi | Secondo raccolto |
|---------------------|---------|----------|---------|------------------|
| Adattabilità | 3 su 4 | 3 su 4 | 2 su 4 | 4 su 4 |

Consigli di coltivazioni

| | |
|-----------------------------|---|
| Densità delle piante | 40 - 55 Plants/m ² |
| Pre inoculato | La durata di conservazione dell'inoculo è di 80-90 giorni con una temperatura di conservazione di 18°C. La Temperatura più bassa la conservazione ha un impatto positivo sulla durata della vita dei rizobi sui semi. Consigliamo una temperatura inferiore a 25°C per lo stoccaggio e il trasporto di semi preinoculati. |



The results and recommendations given in this document are the values based on MAS Seeds R&D network and are intended for general guidance. We cannot assume any liability for the future achievement of these values, as the individual results and the performance may vary in different local growing, soil and weather conditions.